

מה כדי לא פש ר ל תינוק ?

1. התינוק זוקק למורכב תונעה בתות. מומלך להינו על הרצפה ולשם עצועים במרחיק של ס"מ סממו. קרilmד לנוע לעברם ולאוח בהם.
2. התינוק בודק חפצים על ידי הכנסתם לפה. נתנו לסקק לו חפצים בטיחותיים בעלי מרקמים שונים ובמול המתאים (גדולים להשניה עליון). קופסת סרט צלילים או גבולה שליא ייגל להניטס לפניו).
3. כאשר התינוק יישב בתרמיכת מבוגר או בכווות עצמו (בשהשוחה), מומלך לסייע לו לדולח (או סיכון). אפשר להגבירו הוכחה חפצים, כמו רעננים או קוביות, ולחזים לו איר להיעדים. עט החמן לילד להוציאם ולהיכניסם בעצמו, ותונעוותו הריאינה מדירותיו יותר.
4. התינוק הנהה, כאשר משמעים לו קולות שוננים. יש לדבר אליו בשפה קללה, נכונה ובורה, לקרה לכל חף בשומו ולהסביר לו כל פעילות. יש לאפשר לו לנערוד להקות את קולויכם.
5. מוצע לעזן את שם המהידק של חפצים שונים בסביבת התינוק ולהסבירו לו את מיקומם, כגון: "זדים על הראש", "מחרא כפאים" אהובים sehrם ומשקהים כמו "קוקו", "זדים על הראש", פעללה עם מטפלין, מאד על הרינווק. כדי לעודד לשיתוף פעולה מתחם מושבם.
6. בזמן הארוחה מומלץ לאפשר לתינוק לטעום מתרפיט המשפה הור עזון שמות המאכלים. וצעיר לעודוד לו להתנסות באכילה בדידם, בכפיית ובוכס (לא בבקבוק). ש לא ישא עליו, כאשר הוא ישא עליו, השלחן **ולא להשתארו לבד בכייאת המבוגר!**
7. **לחשאו את התינוק באםבטין**
לבד אפילו לשנייה!!
באמבטיה: יש לשמו על טمف מהאיימה של המים (37°C). **איי**
8. כאשר בתקעות شيئاוים, יש לדאות לנקיון על ידי עצועה בمبرשת או נקי במטבטיות. אין לחתה ממתוקת.
9. לפעמים התונען נבהל מאושרים זרים. תפעעה זו אופיינית לילן. ולבנות איפשרו לו ליעזר קשר עם זרים בהרתו. ולבנותו ולבנותו.

הוריים, שימו לב!!

יכלה התינוק של התינוק עליה על כושר הבנתו. **יש להשתיח עליו, כל-**
что שהוא עיר ופעיל.

יש להגביר את החהתה המשנה כדי למנוע נפילות ולהקפיד על מעקה מוחות ונועל.

יש להראה חפצים קרטונים מהירג זוו של התינוק (כגון פיעוזים, בנטים וחוחים). הוא עלול להכנסם לפה ולהסתכן בסתיימת דרכו הנשימה.

יש להתאים משוב בטיות ללבב שלו פיל התינוק משקלן. יש להקדיד להושיב את התינוק גנד כיוון הנסעה. **אסו להשאי את מתבוגר לשבות אפילו!**

הגיל 9 חדש עד 9 חדש

אם יש צורן להבוח מטפלת/מסתורת חינוכית, יש להקפיד שתהיה מתאיימה, לעורכי התינוק ולגילוי. התענינות בתרוחש במסגרו ובאזורו הטיפול בתינוק הסייע בדיאוגז וההעפלה.

